


hPSC-运动神经元分化试剂盒

使用说明书

一、产品简介

hPSC-运动神经元分化试剂盒具有高效运动神经元定向分化能力，可用于人多能干细胞向运动神经元诱导分化。分化获得的运动神经元能表达运动神经元的特异性 Marker (如 CHAT, MAP2, Synaptophysin 等)，同时具有运动神经元的电生理活性，适用于体外研究和疾病模型动物的细胞移植研究等。



二、产品信息

表 1: hPSC-运动神经元分化 产品体系

产品信息	货号	规格	储存条件
hPSC-运动神经元分化试剂盒*	RP01018	1 Kit	基础液 2-8 °C 添加剂 -80°C 或 -20°C
运动神经元成熟培养基	RP01018-G	1 Kit	

*每个试剂盒可分化获得 1×10^7 运动神经元前体细胞 (Day 9, MNP)。

*将基础培养基和添加物混匀配置成分化培养基，可在 2-8 °C 中存储，2 周内用完。

三、试剂材料

表 2: 推荐试剂&材料&设备

试剂&材料	品牌 (e.g.)	货号 (e.g.)
NcEpic™ hPSC Medium	首宁生物	RP01001
NcTarget™ hPSC Medium	首宁生物	RP01020
hPSC Dissociation Buffer	首宁生物	RP01007
Blebbistatin	首宁生物	RP01008
Solase细胞消化液	首宁生物	RP01021
ncLaminin511	首宁生物	RP01025
Corning® Matrigel® Matrix	Corning	354277
Poly-L-ornithine	Sigma	P3655
Laminin	Sigma	L2020
TrypLE	Gibco	12604013
DMEM/F12培养基	Thermo Sci.	11330
DPBS, no calcium, no magnesium	Thermo Sci.	14190144
12孔板	Thermo Sci.	150628
T25 培养瓶	Thermo Sci.	156367
1 mL/5 mL/10 mL/25 mL移液管	Thermo Sci.	N/A
15 mL/50 mL离心管	Thermo Sci.	N/A
1.5/2 mL冻存管	Thermo Sci.	N/A
1.5 mL EP管	Axygen	N/A
10 µL/200 µL/1000 µL吸头	Rainin .	N/A
梯度程序降温盒	Thermo Sci.	5100-0001

四、hPSC-运动神经元分化

4.1. 试剂的准备

表 3： hPSC-运动神经元分化试剂盒 产品说明

产品信息	货号	规格	储存条件
hPSC-运动神经元分化试剂盒*包含：	RP01018	1 Kit	
Motor Neuron Differentiation Supplement A (20×)	RP01018-A	1 mL	-80°C 或 -20°C
Motor Neuron Differentiation Supplement B (25×)	RP01018-B	1 mL	
Motor Neuron Differentiation Supplement C (50×)	RP01018-C	1 mL	
Motor Neuron Differentiation Supplement D (50×)	RP01018-D	3×1 mL	
Motor Neuron Differentiation Basal Medium E	RP01018-E	250 mL	2-8 °C
Motor Neuron Cryopreservation Medium F	RP01018-F	20 mL	

*每个试剂盒可分化获得 1×10^7 运动神经元前体细胞 (Day 9, MNP)。

*每个试剂盒可用于 12 孔板 4 个孔或 6 孔板 2 个孔的 MNP 分化 (Day 0-Day 9)，以及 12 孔板 10 个孔或者 24 孔板 20 个孔的 MNP 成熟 (Day 9-Day 30)。

- 4.1.1. 在 4 °C 解冻 Motor Neuron Differentiation Supplement A、B、C、D，不要在 37 °C 条件下解冻。
- 4.1.2. 在生物安全柜中，参考表 3，按照比例使用无菌移液管及枪头混匀配制分化完全培养基 A/B/C/D (1×)。
- 4.1.3. 分化培养基建议现配现用，置于 4 °C 储存，2 周内使用。

Tips: 可根据实际用量将 Motor Neuron Differentiation Supplement A/B/C/D 分装后冷冻保存。冻融总次数不能超过 2 次。

表 4：人类运动神经元分化试剂盒完全培养基 配置说明

种类	组分	终体积
分化完全培养基 A/B/C/D (1×)	Motor Neuron Differentiation Supplement A (20×) /B (25×) /C (50×) /D (50×)	1×
	Motor Neuron Differentiation Basal Medium E	

4.2. 人类多能干细胞来源运动神经元分化

4.2.1. hPSC 的培养和准备：详见 hPSC 培养基使用说明书

(<https://www.shownin.com/download/8.html?page=1> 操作说明书)

4.2.2. Day 0~4: Neuroepithelial Progenitor (NEP) 分化

- 4.2.2.1. Day 0, 当 hPSC 在培养皿中的汇合度达到 80~90% 时，将 hPSC 完全培养基 (NcEpic 或 NcTarget) 吸除，加入 2 mL/孔的 DPBS (不含钙镁)，轻轻摇晃并吸弃。
- 4.2.2.2. 1 mL/孔加入预温的 **Solase 消化液**使溶液完全覆盖孔底，置于 37 °C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱中孵育 5-7 min，轻轻晃动孔板使细胞完全脱离基质。
- 4.2.2.3. 细胞悬液转入 1.5 mL 离心管中，掌上离心机离心 10~15 s。
- 4.2.2.4. 吸弃上清液，加入 1 mL 人运动神经元分化完全培养基 A重悬细胞，轻柔吹打 1-2 次使细胞尽量分散成单细胞，并进行计数。
- 4.2.2.5. 3-5 × 10⁵ cells/孔接种到 Matrigel 包被好的 6 孔板中，每孔加入 2 mL 人运动神经元分化完全培养基 A(含 10 μM 的 **Blebbistatin**)。
- 4.2.2.6. 置于 37°C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱中，水平十字摇匀 3 次，培养。
- 4.2.2.7. 培养 22-24 h 后，吸弃培养基，每孔加入 2 mL 人运动神经元分化完全培养基 A，置于 37°C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱继续培养，每天换液。

Tips: Day 1 及之后换液时，分化完全培养基 A 中不加 Blebbistatin。

4.2.3. Day 4~9: Motor neuron Progenitor (MNP) 分化

- 4.2.3.1. Day 4, 吸弃培养基，每孔加入 2 mL 人运动神经元分化完全培养基 B，置于 37 °C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱中继续培养，每天换液 (Day 4-9)。

4.2.4. Day 9~12: Post-mitotic motor neuron 分化

- 4.2.4.1. Day 9, 吸弃培养基，2 mL/孔加入 DPBS (不含钙镁)，轻轻摇晃并吸弃。
- 4.2.4.2. 加入 1 mL/孔预温的 **Solase 消化液**使溶液完全覆盖孔底，置于 37°C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱中孵育 8-12 min，轻轻晃动孔板使细胞完全脱离。

Tips: 若细胞 12 min 没有完全脱离基质，可适当延长时间到 18~20 min，最长不可超过 20 min。

- 4.2.4.3. 将细胞悬液转入 1.5 mL 离心管中，掌上离心机离心 10~15 s。

- 4.2.4.4. 吸弃上清，加入 1 mL 分化完全培养基 C重悬细胞，轻柔吹打 1-2 次使细胞尽量分散成单细胞，并进行细胞计数。

Tips: 此处获得的 MNP 可冻存，加入 1mL 的 Motor Neuron Crypreservation Medium F 冻存细胞，细胞数建议 2 × 10⁶ cells/管。

- 4.2.4.5. 按照 2-6 × 10⁵ cells/孔的密度接种到 Matrigel (2x) 或者 Laminin 包被的 12 孔板中，加入 1 mL/孔分化完全培养基 C (含 10 μM 的 **Blebbistatin**)。

- 4.2.4.6. 置于 37 °C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱中，水平十字摇匀 3 次，培养。

- 4.2.4.7. 培养 22-24 h 之后，吸弃培养基，加入 1 mL/孔分化完全培养基 C，置于 37 °C，5% CO₂浓度，饱和湿度的培养箱中培养，每天换液 (Day 9-12)。

Tips: Motor Neuron 贴壁较松, 建议使用 2×浓度的 Matrigel 包被培养板, 且 Day 10 及之后换液时要特别轻柔, 并去除 Blebbistatin。


4.2.5. Day 12~35: Motor neuron 成熟

4.2.5.1. Day 12 吸弃培养基, 加入 1 mL/孔分化完全培养基 D, 置于 37 °C , 5% CO₂ 浓度, 饱和湿度的培养箱中, 隔天换液。

Tips: Motor Neuron 贴壁较松, 换液时要特别轻柔。

4.2.5.2. 培养到 Day 30-35 时可获得成熟的 Motor Neuron。可进行相关鉴定。

4.2.5.3. 电生理鉴定: 电生理检测时需要提前使用运动神经元电生理专用培养基 (RP01018-H) 培养 3 天。



hPSC-运动神经元分化试剂盒分化过程中细胞形态图示。标尺: 200 μm。

图 A、B、C、D 分别为分化第 4、9、12、30 天时的细胞形态图示。

五、hPSC-运动神经元前体细胞复苏与成熟培养

5.1. 试剂的准备

表 5： hPSC-运动神经元前体细胞 相关产品体系

产品信息	货号	规格	储存条件
运动神经元成熟培养基*包含	RP01018-G	1 Kit	
Motor Neuron Differentiation Supplement C (50×)	RP01018-C	1 mL	-80°C 或 -20°C
Motor Neuron Differentiation Supplement D (50×)	RP01018-D	3×1 mL	
Motor Neuron Differentiation Basal Medium E	RP01018-E	200 mL	2-8 °C

5.1.1. 在 4 °C 解冻 Motor Neuron Differentiation Supplement C、D，不要在 37 °C 条件下解冻。

5.1.2. 在生物安全柜中，参考表 4 配制分化完全培养基 C/D (1×)。

5.1.3. 分化培养基建议现配现用，置于 4 °C 储存，2 周内使用。

Tips: 可根据实际用量将 Motor Neuron Differentiation Supplement C/D 分装后冷冻保存。冻融总次数不能超过 2 次。

5.2. hPSC-运动神经元前体细胞复苏与成熟培养

5.2.1 将水浴锅预热至 37 °C。将 Matrigel 或者 Laminin 包被的 6 孔板，提前放置生物安全柜中约 30 分钟恢复至室温。

5.2.2 取适量分化完全培养基 C，按照 1:1000 比例加入 Blebbistatin (终浓度 10 μM)，恢复至室温。

5.2.3 从液氮罐中取出 1 管冻存的 hPSC-运动神经元前体细胞，干冰转移至细胞间，立即放置于 37 °C 水浴锅中手持轻轻摇晃，1 分钟内解冻，肉眼观察细胞悬液内冰晶即将完全消失时取出。

5.2.4 75% 酒精无尘纸擦拭冻存管表面，转入生物安全柜中；将细胞悬液移到事先准备好的 15 mL 离心管中，移液管吸取 10 mL DMEM/F12，逐滴加入冻存细胞悬液，过程中轻柔晃动混匀细胞，178 × g 离心 5 分钟。

5.2.5 弃去上清，加入预温的 1 mL 分化完全培养基 C 混匀细胞，尽量避免吹打，取适量细胞计数。按照 $2-6 \times 10^5$ cells/孔的密度接种到 Matrigel 或者 Laminin 包被的 12 孔板中。置于 37 °C，5% CO₂ 浓度，饱和湿度的培养箱，水平十字摇匀 3 次，培养。

5.2.6 培养 22-24 h 之后，吸弃培养基，加入 1 mL/孔分化完全培养基 C，置于 37 °C，5% CO₂ 浓度，饱和湿度的培养箱中培养，培养 3 天，此时可参照 2.2.4 培养步骤进行操作。

5.2.7 Day 3 吸弃培养基，加入 1 mL/孔分化完全培养基 D，置于 37 °C，5% CO₂ 浓度，饱和湿度的培养箱中，隔天换液。


Tips: Motor Neuron 贴壁较松，换液时要特别轻柔，并去除 Blebbistatin。

5.2.8 培养到 Day 18-23 时可获得成熟的 Motor Neuron。可进行相关鉴定。使用 TrypLE 消化 (37 °C，10-15

min, 不要超过 15 min) 处理成单细胞, 用于后续检测。

5.2.9 qPCR 鉴定: 至少用 2×10^6 细胞抽提 RNA, 随后进行相关鉴定。

5.2.10 电生理鉴定: 电生理检测时需要提前使用运动神经元电生理专用培养基 (RP01018-H) 培养 3 天。



hPSC-运动神经元前体细胞复苏后 Day1-Day21 细胞形态图示。标尺: 200 μm 。